

260 Paloma zurita



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Macho (02-VI)

PALOMA ZURITA (*Columba oenas*)

IDENTIFICACIÓN

30-33 cm. **Adultos** con coloración general gris azulada, sin blanco en el ala ni en el obispillo; ala con dos franjas negras cerca del borde posterior; cuello con tinte verdoso y púrpura; cola gris con dos barras terminales; patas rojas, pico rojo con amarillo en la punta. **Juveniles** pardos, sin reflejos metálicos en el cuello.



Paloma zurita. Diseño del obispillo, infracoberteras alares y ala.

ESPECIES SIMILARES

Puede haber confusión con la **paloma bravía/doméstica**, que tiene obispillo blanco y es blanca por debajo del ala. La **paloma torcaz**, de mayor tamaño, tiene una franja blanca en el ala.



Paloma doméstica



Paloma torcaz

SEXO

Macho con manto, terciarias y escapulares de color gris azulado; mancha brillante del collar ancha. **Hembra** con manto, terciarias y escapulares de color gris-marrón; mancha brillante del collar más estrecha (**CUIDADO:** con plumaje gastado ambos sexos son similares).



Paloma zurita. Determinación del sexo. Diseño del collar: arriba macho; abajo hembra.

260 Paloma zurita



Paloma zurita. Determinación del sexo. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.



Paloma zurita. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y cuello: arriba adulto; abajo juvenil.



Paloma zurita. Determinación del sexo. Diseño de las escapulares: izquierda macho; derecha hembra.



Paloma zurita. Determinación de la edad. Color de las patas: arriba adulto; abajo juvenil.

EDAD

Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:

Juveniles sin iridiscencia en el cuello; coberteras del ala, terciarias y plumas del dorso de color marrón; patas grisáceas.

1º año otoño reconocibles hasta completar la muda por tener las plumas de vuelo poco desgastadas.

2º año primavera sólo en los ejemplares que hayan detenido la muda, por conservar coberteras primarias juveniles de color marrón.

Adultos con iridiscencia en el cuello; pequeñas y medianas coberteras y plumas del dorso de color azulado; coberteras primarias gris-negro; patas rojizas. En **otoño** se reconocen hasta completar la muda por tener las plumas de vuelo viejas muy desgastadas. En **primavera**, los ejemplares que hayan detenido la muda se reconocen por tener todas las coberteras primarias de color gris-negro.



Paloma zurita. Determinación de la edad. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto; abajo juvenil.

260 Paloma zurita



Paloma zurita. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de las plumas no mudadas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.



Paloma zurita. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de secundarias no mudadas: arriba adulto; abajo 1º año.



Paloma zurita. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de primarias no mudadas: arriba adulto; abajo 1º año.



Paloma zurita. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de las plumas del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

260 Paloma zurita

MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas en diciembre (o más tarde en los juveniles de nidadas tardías). Ambos tipos de edad, más frecuente en juveniles, pueden detener la muda y dejar plumas de vuelo sin cambiar.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie presente todo el año; repartida por toda la Comunidad, falta sólo en el alto Pirineo y algunas zonas del Sistema Ibérico.




Paloma zurita. Primavera. 2º año. Hembra ().



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Hembra (17-V).



Paloma zurita. Primavera. Juvenil (06-VI)





Paloma zurita. Primavera. 2º año. Macho ().



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (02-VI); abajo hembra (17-V).

260 Paloma zurita



Paloma zurita. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (); centro 2º año hembra (); abajo juvenil (06-VI).



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (02-VI); derecha hembra (17-V).



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (02-VI); derecha hembra (17-V).



Paloma zurita. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (06-VI).



Paloma zurita. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (06-VI).

260 Paloma zurita



Paloma zurita. Primavera. Color de las patas: arriba adulto (17-V); abajo juvenil (06-VI).



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (02-VI); derecha hembra (17-V).

Paloma zurita. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (02-VI); derecha hembra (17-V).



Paloma zurita. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (06-VI).




Paloma zurita. Primavera. Diseño de terciarias: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (06-VI).

260 Paloma zurita



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias (02-VI).




Paloma zurita. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de coberteras primarias ().



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias (17-V).



Paloma zurita. Primavera. Juvenil: diseño de coberteras primarias (06-VI)



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias ().



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Macho: diseño de primarias (02-VI)


260 Paloma zurita



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de primarias (17-V)




Paloma zurita. Primavera. Adulto. Macho: diseño de secundarias (02-VI)



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Macho: diseño de primarias ()




Paloma zurita. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (17-V)



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de primarias ()



Paloma zurita. Primavera. Juvenil: diseño de primarias (06-VI)



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Macho: diseño de secundarias ()


260 Paloma zurita




Paloma zurita. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de secundarias ()



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (17-V)



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala ()



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala ()

Paloma zurita. Primavera. Juvenil: diseño de secundarias (06-VI)



Paloma zurita. Primavera. Juvenil: diseño del ala (06-VI)

Paloma zurita. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (02-VI)

260 Paloma zurita



Paloma zurita. Otoño. Adulto (28-X)



Paloma zurita. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (28-X); derecha 1º año (28-X).



Paloma zurita. Otoño. 1º año (28-X)



Paloma zurita. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (28-X); derecha 1º año (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (28-X); abajo 1º año (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Color de las patas: arriba adulto (28-X); abajo 1º año (28-X).

260 Paloma zurita



Paloma zurita. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (28-X); derecha 1º año (28-X).



Paloma zurita. Otoño. 1º año: diseño de coberteras primarias (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Diseño de terciarias: izquierda adulto (28-X); derecha 1º año (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Adulto: diseño de primarias (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Adulto: diseño de coberteras primarias (28-X).

260 Paloma zurita



Paloma zurita. Otoño. 1º año: diseño de primarias (28-X).

Paloma zurita. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Adulto: diseño del ala (28-X).

Paloma zurita. Otoño. Adulto: diseño de secundarias (28-X).

260 Paloma zurita



Paloma zurita. Otoño. 1º año: diseño del ala (28-X).